

Корь

острая вирусная инфекционная болезнь



источник заражения

больной
человек



вirus
выделяется
при чихании
и кашле

симптомы



температура
38-40
градусов



резкая
слабость




отсутствие
аппетита



сухой
кашель,
насморк



конъюнктивит



через 2-4 дня после
первых симптомов
болезни на слизистой
оболочке щёк –
возникают мелкие
беловатые высыпания



на 3-5 день болезни
появляется сыпь в
виде ярких пятен
за ушами и на лбу,
на лице, шее, теле и
конечностях



самые частые
осложнения –
воспаление лёгких,
носоглотки, тяжёлый
отит, конъюнктивит.

За получением более подробной консультации обращаться
в лечебное учреждение по месту жительства


**Лечение заболевания должно проводиться
под медицинским контролем!!!**

Надёжным и эффективным
методом профилактики кори
является вакцинация



ДИФТЕРИЯ

это серьезное заболевание, которое вызывается токсинами, вырабатываемыми возбудителем - дифтерийной коринебактерией, и известно своими проявлениями: общей слабостью, отеком и сероватым налетом (псевдомембранны) на слизистой оболочке глотки, носа, горлани, на миндалинах, затрудняющими дыхание и глотание. Болезнь может привести к смерти.



Кто в группе риска?

Люди любого возраста без актуальной иммунизации




Пути передачи

Воздушно-капельный путь при кашле или чихании



Через раны и микротравмы кожных покровов



Через игрушки, одежду, постель и другие вещи, зараженные бактерией - возбудителем дифтерии



К симптомам дифтерии относятся:



Лихорадка



Слабость



Припухшие лимфоузлы ("железы") в области шеи



Боль в горле, шумное дыхание



Серые пленки на задней поверхности глотки и миндалин (появляются на 2-3 день болезни)

Без надлежащего лечения дифтерия опасна развитием осложнений:



Затрудненное дыхание, удушье



Миокардит (повреждение сердечной мышцы)



Поражение нервной системы

Летальный исход

Специфическая профилактика дифтерии с помощью прививок

Дети: вакцинация трехкратно в 2,4,6 месяцев; 1я ревакцинация в 18 месяцев; 2я ревакцинация в 6 лет



Подростки: 3я ревакцинация в 14 лет.

Взрослые: подлежат ревакцинации каждые 10 лет.