

Рекомендации для родителей

При первых подозрениях на наличие психического расстройства у ребенка необходимо обратиться к врачу для обследования, уточнения диагноза и назначения адекватного лечения!

Родителям ребенка, у которого поставлен диагноз «шизофрения», стоит всегда помнить, что лечение данного заболевания должно проходить исключительно врачами специалистами. Не стоит предпочитать визит к народному целителю визиту в специализированное медицинское учреждение! Любое самостоятельное вмешательство в ход и методы лечения шизофрении может привести к непоправимым результатам.

При несвоевременном выявлении шизофрении приводит к инвалидности ребенка, ограничивая его возможности в обучении, самообслуживании, контроле за своим поведением.



Помните!
**Чем раньше выявлена
болезнь, тем больше
шансов у ребенка стать
адаптированным
к жизни в обществе!**

**РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ
ПРИЗНАКОВ
ДЕТСКОЙ
ШИЗОФРЕНИИ**



Шизофрения – психическое заболевание, протекающее с крайне разнообразными расстройствами, характеризующееся снижением эмоциональности, познавательной способности и активности ребенка, уходом от общения, бредом и галлюцинациями.

Причины заболевания

Причины шизофрении до настоящего времени не установлены.

Среди возможных факторов, связанных с риском развития заболевания, выделяют:

наследственную предрасположенность;
стрессовые ситуации (родительские скандалы, отрыв от семьи, смена обстановки);
инфекционные заболевания во внутриутробный период развития ребенка;
черепно-мозговые травмы.

Основные симптомы заболевания

Проявления шизофрении зависят от возраста.

В возрасте до 3 лет малыш выполняет однообразные действия, может долго ходить по кругу, становится крайне импульсивным, часто беспричинно плачет или смеется.

В дошкольном и школьном возрасте можно заметить снижение активности ребенка, отсутствие связной речи, эмоциональное обеднение в сочетании с погруженностью в свой собственный мир, различные страхи, двигательную расторможенность, патологическое фантазирование.

Частым проявлением шизофрении являются зрительные и слуховые галлюцинации, бред.

У подростков проявления шизофрении легко принять за признаки переходного возраста. Заболевание проявляется идеями физических недостатков, анорексией, философической интоксикацией (чрезмерный интерес к абстрактным проблемам, примитивные размышления на эту тему), расстройством поведения в виде грубости, жестокости, сексуальной расторможенности, склонности к употреблению алкоголя, наркотиков.

Нередко у детей и подростков при шизофрении встречаются нарушения памяти, внимания, мышления, речи.

